



Visualización del intestino delgado amigable para el paciente

Si usted o un ser querido padece sangrado gastrointestinal (GI), enfermedad de Crohn o anemia por deficiencia de hierro, su médico puede necesitar ver el interior de su intestino delgado para evaluar su condición.¹

Con el sistema PillCam™ SB3, esto se realiza con una cápsula ingerible del tamaño de una vitamina. Este folleto explica qué ocurre durante el procedimiento, cómo prepararse y qué esperar después.*

Su procedimiento está programado para:

Para información adicional llame:

Instrucciones del médico o enfermera:

Pregunte a su médico sobre el sistema PillCam™ SB3.

Inside ofrece cápsula endoscópica Medtronic, llevamos grabador, cápsula y laptop para descarga de imágenes hasta su consultorio, hospital o casa del paciente. Un especialista te acompaña para la colocación y facilita laptop para el reporte médico.

Información de riesgos: Los riesgos del sistema PillCam™ SB3 incluyen retención de la cápsula, aspiración, irritaciones de la piel, obstrucción, perforación y lesión o sangrado de la mucosa. La colocación endoscópica puede presentar riesgos adicionales. Puede ser necesaria intervención médica, endoscópica o quirúrgica para atender cualquiera de estas complicaciones, en caso de que ocurran. Después de ingerir la cápsula PillCam™ SB3, y hasta que la cápsula sea excretada, los pacientes deben evitar fuentes de campos electromagnéticos potentes. Estas incluyen los creados por dispositivos de resonancia magnética (MRI). Consulte a su médico para más información.


Referencia: 1. Gerson LB, Fidler JL, Cave DR, Leighton JA. ACG clinical guideline: diagnosis and management of small bowel bleeding. Am J Gastroenterol. 2015;110(9):1265-87.



Vea el panorama completo de su salud GI

El sistema PillCam™ SB3 - una forma sencilla de evaluar el intestino delgado

* Este folleto está destinado a complementar las indicaciones y explicaciones de su médico sobre la ingesta de una cápsula PillCam™ SB3. No reemplaza la atención, el consejo ni las instrucciones específicas de su médico sobre su procedimiento.



El sistema PillCam™ SB3

El intestino delgado conecta el estómago con el intestino grueso y ayuda en la digestión y otros procesos metabólicos. El sistema PillCam™ SB3 es una cápsula ingerible que permite a su médico visualizar todo su intestino delgado.

Cómo funciona el sistema PillCam™ SB3

La cápsula PillCam™ SB3 contiene una diminuta cámara y una fuente de luz que toma imágenes de su intestino delgado mientras viaja naturalmente por su tracto digestivo.

Luego, las imágenes se transmiten a un grabador mediante sensores colocados en su abdomen o en un cinturón de sensores que se lleva sujeto alrededor del cuerpo.



Preparación para su procedimiento PillCam™ SB3

Alimentos y bebidas

Un estómago vacío es óptimo para la visualización. Es posible que se le pida seguir una dieta de líquidos claros después del almuerzo del día anterior al procedimiento. También puede comenzar el ayuno a medianoche. Su médico le dará instrucciones específicas.

Medicamentos

Informe a su médico con anticipación sobre cualquier medicamento que tome regularmente. Es posible que necesite ajustar su dosis habitual para el procedimiento. Sin embargo, debe hablar con su médico antes de hacer cualquier cambio en sus medicamentos.

Historial médico

Informe a su médico sobre su historial médico, incluyendo:

- Marcapasos u otros dispositivos electromédicos
- Cirugía abdominal previa
- Dificultad para tragar
- Antecedentes de obstrucciones en el tracto gastrointestinal

Después de su procedimiento

Como no se requiere sedación, una vez que trague la cápsula PillCam™ SB3 puede salir del consultorio del médico y continuar con sus actividades normales.

También podrá comer cuatro horas después de ingerir la cápsula, a menos que su médico le indique lo contrario. Evite campos electromagnéticos fuertes, como los dispositivos de MRI, hasta que haya expulsado la cápsula en una evacuación.

Al final del procedimiento, el grabador y los sensores se retirarán y se devolverán a su médico.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto dura el procedimiento?

Por lo general, pasará aproximadamente 30 minutos en el consultorio de su médico para iniciar el procedimiento. Una vez que los sensores o el cinturón de sensores se coloquen en su abdomen, el grabador esté conectado y usted haya tragado la cápsula, puede retirarse. La prueba puede durar hasta 12 horas.

¿Qué sucede después de devolver el grabador y los sensores a mi médico?

Las imágenes capturadas durante su procedimiento se descargarán a una computadora y su médico las verá en un video a color. Después, se comunicarán con usted para informarle los resultados.

¿Sentiré dolor o molestia por la cápsula?

No. No debería sentir ninguna molestia al tragar la cápsula PillCam™ SB3 ni mientras se mueve por su tracto GI. La cápsula es desechable y pasa naturalmente con la evacuación intestinal. Sin embargo, si presenta dolor u otros síntomas preocupantes, comuníquese con su médico de inmediato.

